




Hướng Dẫn Thảo Luận Về Sinh Con Có Hỗ Trợ

Sử dụng hướng dẫn này khi thảo luận với nhóm về việc sinh con qua đường âm đạo có hỗ trợ hoặc sinh mổ. Sinh con có hỗ trợ có thể thích hợp nếu tình trạng của quý vị đáp ứng các tiêu chí sau, nhưng **hãy thảo luận cùng với nhóm của quý vị xem điều gì là tốt nhất cho quý vị và con của quý vị** (xem Hướng Dẫn Hỗ Trợ Chuyển Dạ để biết các tùy chọn).

Những lý do nào khiến quý vị cân nhắc về việc sinh con có hỗ trợ?		Những điều kiện TỐI THIỂU để sinh con có hỗ trợ là gì?*	
 MẸ	Yêu cầu	→	<input type="checkbox"/> Quý vị tin rằng sinh con có hỗ trợ là lựa chọn tốt nhất cho quý vị sau khi đã thảo luận cùng nhóm chăm sóc của quý vị
 CON	Quan ngại về sức khỏe thai nhi	→	<input type="checkbox"/> Nhịp tim chậm liên tục HOẶC <input type="checkbox"/> Chưa đến lúc sinh và kèm theo: <input type="checkbox"/> Tim thai chậm lặp lại nhưng không hồi phục khi hồi sức thai <input type="checkbox"/> Tim thai cao nhưng không hồi phục khi hồi sức thai
	Chuyển dạ chậm	→	Hoặc: <input type="checkbox"/> Chuyển dạ trong giai đoạn đầu (cổ tử cung mở từ 4 cm trở xuống) trong 24 giờ hoặc lâu hơn <input type="checkbox"/> Dùng thuốc hỗ trợ cơn gò và vỡ ối trong 15 giờ hoặc lâu hơn
 TIẾN TRIỂN	Tiến triển chậm	→	Cổ tử cung không mở thêm khi đã vỡ ối hay đã mở từ 6 cm trở lên và kèm theo: <input type="checkbox"/> Cơn gò đã kéo dài từ 4 giờ trở lên <input type="checkbox"/> Dùng thuốc hỗ trợ cơn gò từ 6 giờ trở lên
	Rặn đẻ quá lâu nhưng không có tiến triển	→	Hoặc: <input type="checkbox"/> Rặn đẻ ít nhất 3 giờ nếu đây là lần chuyển dạ đầu tiên của quý vị <input type="checkbox"/> Rặn đẻ ít nhất 2 giờ nếu trước đây quý vị đã từng chuyển dạ

* Tình trạng tối thiểu được dựa trên Sự Đồng Thuận của Ngành Chăm Sóc Sản Khoa về Dự Phòng An Toàn trong Sinh Mổ Chính của ACOG và SMFM